

Identification

Expéditeur: DGAPSP (Direction générale adjointe de la protection de la santé publique)

Objet : Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) survenant à la suite d'une vaccination

Date : 2021-04-29

Ce qu'il faut savoir

Depuis décembre 2020, la campagne de vaccination contre le virus de la COVID-19 suit son cours.

La *Loi sur la santé publique* (art. 69) requiert des professionnels de la santé de déclarer les manifestations graves ou inhabituelles qui surviennent après une vaccination.

La très grande majorité des manifestations post-vaccinales sont bénignes et auto-résolutives. **La consigne pour Info-Santé est à l'effet que seules les MCI GRAVES*** sont à signaler à la Direction de santé publique de résidence de la personne.

***MCI GRAVE** : définie comme un ensemble de symptômes cliniques dont l'évaluation de la sévérité, *sans tenir compte d'un vaccin antérieur*, amène d'emblée à recommander une consultation urgente immédiate.

À ne pas signaler : les manifestations cliniques dont l'évaluation de la sévérité (*indépendamment d'un vaccin antérieur*) n'amène pas de recommandation de consultation urgente. Par exemple, on recommande d'observer les symptômes et si aggravation dans les 24-48 heures, d'aller consulter : le signalement incombera au clinicien qui verra cette personne à ce moment.

Ce qu'il faut faire

La démarche clinique à suivre si une personne appelle en se demandant si son vaccin est la cause de ses malaises est la suivante :

1. **Éviter ce raisonnement erroné** : la personne a reçu un vaccin DONC ses symptômes sont peut-être plus graves qu'ils n'en ont l'air. DONC, je dois l'envoyer consulter, DONC, je déclare une MCI.
2. **Évaluer, pour ce qu'ils sont**, les symptômes rapportés par la personne, sans égard à la vaccination antérieure ou au vaccin administré.
3. Si les symptômes en eux-mêmes (sans égard au vaccin administré) nécessitent une consultation immédiate à l'urgence (MCI **GRAVE***), recommander la consultation et signaler cette MCI à la DSPublique de résidence du cas, en transmettant la fiche d'appel contenant les informations requises.
4. **Ne pas signaler les autres MCI**. Donner les recommandations d'usage en fonction de la symptomatologie. Ne pas référer la personne au centre de vaccination. Ne pas se prononcer sur le lien de cause à effet avec la vaccination.
5. Dans le cas des réactions locales au site de vaccination, donner les conseils d'usage (compresses froides, anti-inflammatoires) et expliquer qu'il s'agit d'un effet secondaire désagréable mais attendu et, que ce n'est pas une contre-indication à la poursuite de la vaccination, même s'il est possible qu'il récidive.

S'IL S'AGIT D'UNE MCI GRAVE*, VOUS DEVEZ INSCRIRE SUR LA FICHE D'APPEL DE L'USAGER LE CODE DE RAISON D'APPEL 3803. On demande alors que le **nom de l'infirmière, son numéro de pratique ainsi que le NAM de la personne appelante** soient inscrits sur la fiche d'appel.

Autres actions spécifiques en lien avec les vaccins Astra Zeneka (AZ) et Covishield. Les vaccins AZ et Covishield administrés contre la COVID-19 comportent un risque d'environ 1 cas par 100 000 personnes vaccinées de thrombose avec thrombocytopénie dans les 4 à 20 jours après l'injection.

On considérera que, si dans les 4 jours ou plus suivants la vaccination, les symptômes sévères suivants apparaissent, on orientera la personne vers une consultation rapide :

- Un essoufflement important inhabituel;
- De la douleur à la poitrine d'allure non musculosquelettique;
- Une enflure nouvelle et inhabituelle des jambes;
- Une douleur au ventre persistante;
- Un mal de tête important subit ou qui dure depuis plusieurs jours;
- Une vision floue; ou
- De multiples bleus ou de nombreuses taches de sang sur la peau.

Qui contacter à la DSP ou à la DPSP (Réservé aux professionnels de la santé)

- Pour les adresses et informations relatives aux directions de santé publique pour l'envoi des signalements de MCI : <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf> ou consulter la liste des boîtes courriels corporatives (annexe 1).

Liens utiles

- Pour en savoir plus sur les manifestations cliniques inhabituelles et les critères qui les définissent, consulter le <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/declarer-une-mci/>
- Pour de l'information pour le RAPPORT DE DÉCLARATION DE MANIFESTATIONS CLINIQUES INHABITUELLES APRÈS UNE VACCINATION :
<http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/29d0d6ae68a554f485256e1a006ba71c/458ccd44026257e5852581c9005ee220?OpenDocument>
- Pour plus de détails au sujet des thromboses / thrombocytopénies à la suite des vaccins AZ COVID-19 ou Covishield, consulter l'avis du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI):
- <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/reponse-rapide-recommandation-utilisation-vaccin-astrazeneca-covid-19-jeunes-adultes.html>;
- Pour l'information pour les professionnels de la santé sur la vaccination contre la COVID-19 :
<https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/>
- Pour de l'information sur le vaccin contre la COVID-19 (PIQ, [mise à jour du 20](#) avril 2021)
- Pour de l'information sur les groupes prioritaires : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/#c78786>
- Pour connaître les coordonnées des DSPublique :
<https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf>

[illegible]