



Ministère de la Santé et des Services sociaux

Direction de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses

**Dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 et
co-administration avec le vaccin antigrippal
Présentation à la Table logistique du 20 octobre 2021**

Lina Perron M.D, M.Sc.



Raisons de la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 pour les résidents de milieux de vie collectifs

- Recommandation du [CIQ](#) d'administrer une dose de rappel faite le 28 septembre 2021
- Données épidémiologiques
 - Variant Delta, plus contagieux et plus virulent
 - Augmentation du nombre de cas dans toutes les tranches d'âge
 - Augmentation du nombre d'éclosions dans différents milieux, dont les CHSLD et les RPA



Raisons de la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 pour les résidents de milieux de vie collectifs

- Réponse immunitaire des personnes âgées généralement inférieure à celle des adultes
- Dose de rappel augmente le niveau de protection
- Quantité d'anticorps après la dose de rappel entraîne une élévation plus importante du nombre d'anticorps que celle observée après la 2^e dose
- Dose de rappel permet de diminuer le nombre de cas, de limiter la transmission du virus et par là, à réduire le nombre d'éclosions



Sécurité de la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 et co-administration avec le vaccin contre la grippe

- Une dose de rappel a déjà été administrée à des millions de personnes à travers le monde et aucun enjeu de sécurité n'a été rapporté
- Le fait d'administrer en même temps le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la COVID-19 n'entraîne pas plus de réactions indésirables
- Les réactions locales et générales ressembleront à celles survenues après la 2^e dose du vaccin contre la COVID-19