

2. 3e dose – Dose de rappel

a. Explications des doses de rappel

i. Aux aînés vivant dans la communauté

Pertinence d'offrir une dose de rappel d'un vaccin contre la COVID-19 aux aînés vivant dans la communauté au Québec

- Recommandation d'offrir à toutes les personnes de 80 ans et plus vivant dans la communauté et déjà vaccinées une dose de rappel avec un vaccin à ARNm en respectant un intervalle d'au moins 6 mois depuis l'administration de la dernière dose.
- Pour les personnes âgées de 70 à 79 ans, le besoin et l'utilité d'une dose de rappel sont moins évidents à l'heure actuelle, mais le CIQ considère acceptable que ces personnes puissent se prévaloir de cette dose de rappel si elles le désirent.
- Pour les personnes âgées de moins de 70 ans qui résident dans la communauté au Québec, l'administration d'une dose de rappel n'apparaît pas nécessaire à l'heure actuelle.

2. 3e dose – Dose de rappel

a. Explications des doses de rappel

i. Aux aînés vivant dans la communauté (suite)

- Très bonne réponse immunitaire après une dose de rappel avec un vaccin à ARNm et une augmentation de la protection.
- La fréquence des réactions indésirables est semblable à celle observée lors de l'immunisation primaire.
- Un vaccin à ARNm est recommandé pour un rappel, quels qu'aient été le ou les vaccins utilisés pour l'immunisation primaire.
- Les 2 vaccins à ARNm peuvent être considérés comme interchangeables pour tout rappel.

2. 3e dose – Dose de rappel

a. Explications des doses de rappel

ii. Dose de rappel aux personnes vaccinées avec 2 doses de vaccin à vecteur viral

- Pertinence d'une dose de vaccin à ARN messenger contre la COVID-19 chez les personnes ayant reçu un vaccin à vecteur viral pour la série primaire.
- Recommandation que les personnes ayant reçu une série primaire des vaccins à vecteur viral AstraZeneca/Covishield ou Johnson & Johnson peuvent se voir offrir une dose de rappel de vaccin à ARN messenger 6 mois ou plus après la dernière dose reçue.
- Efficacité vaccinale moins élevée des vaccins à vecteur viral pour contrer l'infection au variant delta du SRAS-CoV-2 de même que la COVID-19 symptomatique par rapport aux vaccins à ARN messenger.
- Efficacité du vaccin AstraZeneca/Covishield à prévenir une maladie grave est comparable ou seulement légèrement inférieure à celle des vaccins à ARN messenger.

2. 3e dose – Dose de rappel

a. Explications des doses de rappel

iii. Dosage de la dose de rappel

- Vaccin de Pfizer : même posologie (30 µg) que pour l'immunisation primaire
- Vaccin de Moderna : **demi-dose** de 50 µg (0,25 ml) plutôt que le dosage de 100 µg (0,5 ml) pour l'immunisation primaire
- 2 présentations des fioles multidoses de Moderna : 10 doses ou 14 doses complètes (théoriquement 20 ou 28 demi-doses)
- Équipe de qualité de Santé Canada autorise un maximum de 20 ponctions dans une fiole multidose (que ce soit une fiole de 10 ou de 14 doses complètes)

2. 3^e dose – Dose de rappel

b. Nouveau module 3^e dose

- 1) Livraison du nouveau service 3^e dose ce vendredi.
 - Service 3e dose
 - Service 3e dose immunodéprimée
- 2) IMPORTANT : Vous ne devez pas ouvrir des plages pour la campagne de vaccination massive pour la 3^e dose dans le même service que les rendez-vous pour les immunodéprimés.
- 3) Possibilité pour les citoyens de changer de site de vaccination et de région.

2. 3^e dose – Dose de rappel

c. Stratégie d'ouverture des rendez-vous

- i. Sans rendez-vous
- ii. Ouverture des plages

OUVERTURE DES RENDEZ-VOUS POUR LES DOSES ADDITIONNELLES DU VACCIN CONTRE LA COVID-19

 **Opération vaccination COVID-19**

DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
NOV. 14	15	16	17	18	19	20
		80 ans et plus		75-79 ans		
21	22	23	24	25	26	27
		70-74 ans		Personnes qui ont reçu 2 doses d'AstraZeneca ou Covishield		

La dose additionnelle doit être donnée **six mois ou plus** après la deuxième dose.

Pour prendre rendez-vous : [Québec.ca/vaccinCOVID](https://quebec.ca/vaccinCOVID)